

Таримал
Ургамал ХХК
ГАРЫН АВЛАГА
2026-2027
Төмс, хүнсний ногооны ургамал хамгааллын
бүтээгдэхүүний гарын авлага
Ургах Бүхнийг
URGA.MN-с



BR24

- Үндэсний хөгжлийг дэмжинэ
- Үр тариандбутлалтын явцыг идэвхжүүлнэ
- Бүрэн хэмжээний түрүү үүсэлтийг дэмжинэ
- Үрийн цутгалт болон жин массыг нэмэгдүүлнэ
- Таримлын хүйтэнд болон ганд, өвчинд хортонд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ



ТАРИМАЛ УРГАМАЛ

Худалдааны нэршил	Үйлчлэх бодис	
1. Үр идэвхжүүлэгч		
- BR24	Эпибрассинолид 0,1%	10
2. Үр ариутгал		
Өвчин + шавжны эсрэг гурвалсан үйлчлэлтэй үр ариутгал		
- Сийдгуард Рапс, төмс	Тиаметоксам 280г/л+Мефеноксам 15г/л+Флудиоксинил 25г/л	11
- Сийдгуард Үр тариа, төмс	Тиаметоксам 262,5г/л+Дифенконазол 25г/л+Флудиоксинил 25г/л	12
Шавжны эсрэг үр ариутгал (утсан өтний эсрэг)		
- Тиара КС	Тиаметоксам 350г/кг	14
3. Өвчлөлийн эсрэг		
- Ридомил Голд МЦ	Манкоцеб 640г/кг + Мефеноксам 40г/кг	15
- Азомеф	Азоксистробин 322г/л +Мефеноксам 124г/л	16
- Ширма КС	Флуазинам 500г/л	17
- Метаксил СП	Манкоцеб 640г/кг + Металаксил 40г/кг	18
4. Тарихын өмнө болон уриншийн бодис		
- Глифосат	Глифосат 540г/л IPA	19
5. Төмс, хүнсний ногооны талбайн хог ургамлын эсрэг УХБ		
Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг		
- Потатосейф	Метрибузин 480г/л	20
- Лазурит СП	Метрибузин 700г/кг	21
- Эскудо ВДГ	Римсульфурон 500г/кг	22
Лууван, төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг		
- Гезагард КС	Прометрин 500г/л	23
Сонгино, сармисны талбайн хог ургамлын эсрэг		
- Эстамп	Пендиметалин 330г/л	24
- Онионсейф	Ацетохлор 22%+ Оксифлоурфен 5%+ Пендиметалин 17%	25
- Гоал 2Е КЭ	Оксифлуорфен 240г/л	26
Хүрэн манжингийн талбайн хог ургамлын эсрэг		
- Бицепс гарант, КЭ	Десмедифам 70г/л + Фенмедифам 90г/л + Этофумеза 110г/л	27
Төмс, лууван, манжин, сонгино, саримс тариалсан талбайн үет хог ургамлын эсрэг		
- Миура	Хизалофоп-П-Этил 125г/л	28
- Клетомекс	Клетодим 240г/л	29

Худалдааны нэршил Үйлчлэх бодис

6. Хортон шавж

- Борей СК Имидаклоприд 150г/л+Лямбда-цигалотрин 50г/л 30
- Актара ВДГ Тиаметоксам 250г/кг 31
- Каратэ МКС Лямбда-цигалотрин 50г/л 32
- Фаскорд КЭ Альфа-циперметрин 100г/л 33
- Сэмпай КЭ Эсфенвалерат 50г/л 34
- Имидаклоприд 200г/л 35
- Имидаклоприд 700г/кг 36

Хивэн эрвээхийн эсрэг био бэлдмэл
- Бациллус туринг иенсис var (kurstaki) 37

7. Адьювант гадаргуугийн идэвхжүүлэгч

- Трисилоксан этоксилат 38
- Этоксилат изодецилийн спирт 39


8. Болц түргэсгэгч, хатаагч

- Мон Дикват Дикват 200г/л 40

9. Ургалтын үеийн бордоо

- Amino BR 41
- BR24 42
- Коколи бордоо 43
- K хүч бордоо 44
- N хүч бордоо 45
- Борын бордоо 46

Төмсний ургалтын үеийн ургамал хамгааллын схем		Үрийг тариалалтанд бэлдэх	Тарилт
Зориулалт/ Хөнөөлт организм			00
Ур идэвхжүүлэгч	Ризоктониоз, Фузариоз Альтерниоз, Хуурай илжрэл, Энгийн цахлай, Хар цахлай Хар хөл Утсан өт	Br24 0.4л/т	
Өвчин, Шавжны эсрэг		Сийдгуард (Тиаметоксам 280г/л + мефеноксама 15г/л + Флудиоксонил 25г/л) 0.4л/т	
Ур ариутгал		Тиаметоксам 250г/кг 0.03-0.06 кг/т	
Өвчний эсрэг	Фитофтор, альтернариоз		
Шавжны эсрэг	Утсан өт буюу няслуур цохны авгалдай, колорад цох, ургамлын бөөс, хачиг		
	Фроловын буглаа цох, колорад цох, ургамлын бөөс, шөвгөр хошуут цох		
Хог ургамлын эсрэг	Нэг ба олон наст үет, Нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамал	Глифосат 540г/л (2.5-3.0л/га)	Метрибузин 700г/кг Лазурит (1.4кг/га)
	Нэг наст үет, Нэг наст хос үрийн талт хог ургамал	Глифосат 540г/л (1.4-2.5л/га)	Метрибузи 480г/л (0.6л/га-0.8л/га)
	Нэг наст үет, Олон наст үет		
	Нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамал	Глифосат 540г/л (2.5-3.0л/га) + Трисилоксан этоксилат	
Навчны бордоо	Таримлын ургалтын үеийн шим тэжээлээр хангах		




Соёололт	Соёолсны дараа (5см хүртэл)	Нахиалах (5см-ээс дээш)	Бундуйлалтын эхэн үе	Бундуйлалтын төгсгөл	Цэцэглэлтийн эхэн	Цэцэглэлт	Цэцэглэлтийн сүүл	Бут хагдрах
03-05	11	15	19	51	55-59	59-65	69-89	91-93
	(Манкоцеб (640г/кг+мефеноксам 40г/кг) (2.5кг/га) Ридомил голд МЦ, ВДГ (1.5-2.05кг/га) Флуазинам, 500г/л- Ширма КС (0.3-0.4л/га)			+ Трисилоксан этоксилат - Фунгицидийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх (400л ажлын уусмал тутамд 0.14л)				
Тиаметоксам 250 г/кг- Актара ВГ (0.07-0.5кг/га)			Тиаметоксам 350 г/кг- Тиара КС (0.5л/га)					
Имидаклоприд 200г/л (250мл/га)		Альфа-циперметрин 100г/л - Фаскорд КЭ (0.1л/га)		Лямбда - цигалотрин, 50г/л- Каратэ (250мл/га)		Борей (0.08 - 0.12л/га)		
Соёололтоос өмнө хэрсний гадаргад бүрхүүл хамгаалалт үүсгэх	Метрибузин700г/кг Лазурит (0.8-1кг/га)	Метрибузин700г/кг - Лазурит (0.8-1кг/га) Римсульфурон 500г/кг - Эскудо ВДГ+ Адью (0.025кг/га +0.2л/га)						Дикват 20% г/кг (2.5-3.0л/га)
	Метрибузин 480г/л (0.6-0.8л/га)	Метрибузин 480г/л + Адью (1.1-1.4л/г+0.2л/га)						
Миура, КЭ хизалофоп-п-этил 125г/л Адью (0.2-1.0л/га + 0.2л/га)				Клетодим, КЭ Клетодим 240г/л Адью (0.2-1.0л/га + 0,2л/га)				
	Метрибузин700г/кг Лазурит (0.8-1кг/га)	Римсульфурон 500г/кг - Эскудо ВДГ + Адью (0.025кг/га + 0.2л/га)						
	N-хүч + K хүч + Br24 (0.2кг/га) + (0.2кг/га) + (0.2л/га) **N+P+K>60%** (20-20-20) + TE (0.2-0.4кг/га)				**K хүч** (0.2кг/га)			

Сонгины ургалтын үеийн ургамал хамгаалын схем

Тариалалтын өмнө,
Үрийг тарилтанд бэлдэх

Зориулалт/ Хөнөөлт организм			00	09
Үр идэвхжүүлэгч	Хуурамч гуалах Илжрэл Зэв Харуу Сонгины ялаа Сонгины ялааны өт	**Br24** 0.4л/т		
Өвчин, Шавжны эсрэг		**Круйзер** (Тиаметоксам 280г/л + мефеноксама 15г/л + Флудиоксонил 25г/л) 0.4л/т		
Үр ариутгал		**Флудиоксонил 25г/л** 0.4л/т		
		Тиаметоксам 250г/кг 0.3-0.6кг/т		
Өвчний эсрэг	Хуурамч гуалах			
Шавжны эсрэг	Утсан өт буюу няслуур цохны авгалдай, колорад цох, ургамлын бөөс, хачиг			
	Фроловын буглаа цох, колорад цох, ургамлын бөөс, шөвгөр хошуут цох			
Хог ургамлын эсрэг	Нэг ба олон наст үет, Нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамал	**Глифосат 540г/л** **(2.5-3.0л/га)** **+ Трисилоксан этоксилат**	**Пендиметалин 330г/л** / **Ацетохлор 22%** **+Оксифлоурфен 5%** **+ Пендиметалин 17%**	
	Нэг наст үет, Нэг наст хос үрийн талт хог ургамал			
	Нэг наст үет, Олон наст үет			
Навчны бордоо	Таримлын ургалтын үеийн шим тэжээлээр хангах			



11	12	11-12	13-15	41	43-45	47	49
		(Манкоцеб (640г/кг+мефеноксам 40г/кг) (2.5кг/га) Ридомил голд МЦ, ВДГ (1.5-2.05кг/га) Флуазинам, 500г/л- Ширма КС (0.3-0.4л/га)	+ Трисилоксан этоксилат - Фунгицидийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх (400л ажлын уусмал тутамд 0.14л)				
Тиаметоксам 250 г/кг- Актара ВГ (0.3-0.4кг/га)							
Имидаклоприд 200г/л (250мл/га)		Лямбда - цигалотрин, 50г/л- Каратэ (250мл/га)		Борей (0.08 - 0.12л/га)			
		Гоал 2Е - Оксифлуорфен 240 г/л (0.5-1.0 г/л) Миура КЭ - Хизалофоп-п-этил 125г/л (0.4-1.2 г/л)				Дикват 20%г/кг (2.5-3.0л/га	
		Оксифлуорфен 240 г/л -Гоал 2Е (0.5-1.0 г/л)					
	Миура, КЭ хизалофоп-п-этил 125г/л Клетодим, КЭ Клетодим 240г/л (0.4-0.5л/га)						
	N-хүч + K хүч + Br24 (0.2кг/га) + (0.2кг/га) + (0.2л/га) N+P+K>60% (20-20-20) + TE (0.2-0.4кг/га)		K хүч +BR24 (0.2кг/га)				

Үр идэвхжүүлэгч BR24

Үйлчлэх бодис: Эпи-брассинолид 0,01%

Зориулалт:
Рапсын цэцгийн тоос, тосны уутанцар, навч, иш, үндэс, цэцэг, үр болон залуу ногооны эд эсэд ихээр агуулагддаг ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик нэгдэл юм. Үрийн соёололтыг идэвхжүүлж, эрүүл эрчимтэй ургалтыг дэмжих, орчны стресс тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг үр ариутгалын бодистой хамт хэрэглэх ургамлын гаралтай үр идэвхжүүлэгч- өсөлт зохицуулагч юм.

• Булцуут ургамлын үрийг ариутгахдаа BR24-тай хамт хэрэглэхэд тарих үеийн соёололтыг идэвхжүүлэхээс гадна, өвчин болон орчны стресс тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

• Ялангуяа хөрсний давсжилт, цочир хүйтрэл, хэт халалт зэрэг орчны таагүй нөхцөлийн тэсвэрлэх чадварын нэмэгдүүлдэг давуу талтай.

Хэт халалт/хүйтрэл

Хөрсний давсжилт

Ган

Өвчин

Хог ургамал



Хэрэглэх заавар:
Үр идэвхжүүлэгчийг тариалалтын өмнө өвчин болон шавжийн эсрэг ариутгалын бодистой хамт зөвлөсөн тунгаар хэрэглэнэ.

Таримлын үр	Хэрэглэх л/т	Ажлын уусмал л/т
Төмс	0.4	10-20
Байцаа		
Лууван		
Шар манжин		
Сонгино		
Сармис		

Анхаарах зүйлс

1. Хэрэглэх үед үрээ хэт удаан дэвтээхээс болгоомжлох. Мөн дэвтээсний дараа нарны шууд тусгалаас хол сүүдэрт хатааж тавина.
2. Усны температур хэт хүйтэн байх нь бодисын үйлчлэлийг багасгана. Хэт халуун ус буюу +30 С-с дээш үед үр хөврөл гэмтэж соёолох чадваргүй болно. Иймд +18 хэмээс +25 хэмийн температур хамгийн тохиромжтой байдаг.
3. Үрийн материалыг шүлтлэг/хүчиллэг бүхий химийн бодистой холихгүй.

Худалдааны нэршил: Br24

Үр ариутгал

Үйлчлэх бодис: Тиаметоксам: 280г/л + Мефеноксам 15г/л + Флудиоксонил 25г/л SC
Аюулын зэрэг: 3 Дунд
Зориулалт: Өвчин шавжийн эсрэг

Төмс, сонгино болон булцуут таримлын үр ариутгахад зориулсан өвчин болон шавжийн эсрэг системийн ба хүрэлцэх үйлчлэлтэй үр ариутгалын бодис.

- Тиометоксам нь үрийн материалаар дамждаг өвчин үүсгэгчид болон таримлыг ургалтын эхэн үеийн хөрс ба гадаргуу дээрх өвчин үүсгэгчид, хортон шавж үүнд: утсан өт, колорад цох, сонгины ялаа зэргээс таримлыг маш сайн хамгаалдаг.
- Мөн найрлагадаа мефеноксам, флудиоксонил агуулсан учир үндэсний системийн өвчлөл, үрийн булцуу ялзрах эрсдэлээс давхар хамгаалж цаашлаад соёололтыг жигд хүчтэй болгодог ба төмс болон сонгины тариалалтад ашиглахад өндөр ач холбогдолтой.
- Бүтээгдэхүүний хортон шавжид үзүүлэх үйлчилгээ нь төмс сонгино болон бусад булцуут тарималын үр соёолох үеэс эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бодис нь үрэнд нэвчин орж, ургамал өсөх явцад бүхэлдээ тархан шимэгдэнэ. Ингэснээр таримал нь

Бүтээгдэхүүний давуу талууд:

+Ариутгагдсан үрүүд жилийн турш чанарын үзүүлэлтээ алдахгүй.

+Өвчин, хортон шавжийн олон төрлийн эсрэг удаан хугацаанд хамгаалалтын үйлчилгээтэй – тариалснаас хойш 45 хүртэл хоног.

Анхаарах зүйлс болон зөвлөмж

1.Ариутгасан боловсруулсан үрийг хүнсний зориулалтаар, мал, амьтны тэжээлд ашиглаж хэрэглэх, зарж борлуулах хориотой. Зөвхөн тарих үрийн материал ариутгах зориулалттай болно.
2.Тиаметоксамийг ашиглаж байгаа үед зөгий болон ашигтай шавжид хор нөлөө учруулж болзошгүй.
3.Зөвлөсөн тунг хэтрүүлсэн тохиолдолд үрийн гадаргууг түлж, соёололтын чадварыг бууруулах эрсдэлтэй.
4.Үр идэвхжүүлэгчтэй хэрэглэх тохиолдолд Үр ариутгал + үр идэвхжүүлэгч гэсэн дарааллаар ажлын уусмал бэлдэнэ.
5.Анхны сав баглаатай 3 жил, 0 хэмээс +35 хэмд нарны шууд тусгалаас хол, хүүхэд хүрэхгүй газар хадгална
6.PVC бээлий, нүүрний хаалт, респиратор (N95 түвшинд) ашиглах
7.Ажил дууссаны дараа гараа савандаж угаах, хувцсаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Таримлын үр	Хэрэглэх норм (л/тн)	Ажлын уусмал (л)	Хөнөөл
Төмс	0.4-0.8	7	**Өвчин**: Үндэсний ялзрал, фитофтор, цахлай, хар хөл, хүрэн толбо, фомоз, гаулах, ишний ялзрал **Хортон шавж**: Утсан өт, колорад цох, шөвгөр хошуут, трипс, бүүргэнэ, цагаан далавчтан
Сонгино, сармис			**Өвчин**: Үндэсний илжрэл, гаулах, үрийн хөгц, **Хортон шавж**: Сонгины өт, ялаа
Рапс	8-16	10-50	**Өвчин**: Үндэсний илжрэл, фомоз, альтернариоз, **Хортон шавж:** Тооноложин цэцэгтний үсрэгч цох, рапсын навчит цох,

Худалдааны нэршил: Сийдгуард

Хадгалах нөхцөл: (-10ºC) – (+35ºC) 3 жил

Үр ариутгал

Үйлчлэх бодис: Тиаметоксам: 262,5г/л + Дифенконазол 25г/л + Флудиоксонил 25г/л SC
Аюулын зэрэг: 4 Бага

Зориулалт: Өвчин шавжийн эсрэг

Төмс, болон булцуут таримлын үр ариутгахад зориулсан өвчин болон шавжийн эсрэг системийн ба хүрэлцэх үйлчлэлтэй үр ариутгалын бодис. Үрийн материалаар дамждаг өвчин үүсгэгчид болон таримлыг ургалтын эхэн үеийн хөрс ба гадаргуу дээрх өвчин үүсгэгчид, хортон шавжаас хамгаалдаг. Үндэсний системийн өвчлөлтүүдээс хамгаалдаг. Ургамлын өсөлт хөгжлийн физиологийн үйл ажиллагааг дэмжсэнээр таримлыг жигд соёолуулдаг. Үр ариутгалын бодисын идэвхтэй нэгдлүүд нь буудайн бутлалтын төгсгөл хүртэл 25-40, хоногийн турш хөнөөлт организмаас хамгаалдаг. Ургамлын өсөлт хөгжлийн эрт үед хортон шавж, өвчний эсрэг боловсруулалт хийхгүй байх боломж олгоно.

Флудиоксонил (25г/л) – Хүрэлцэх үйлчлэлтэй. Аскомицет, базидомицет зэрэг үрийн материалын хадгалалтын үеийн болон хөрсөөр дамжин халдварладаг өвчин үүсгэгчээс хамгаалдаг. Тарих үрийн гадаргууд хамгаалах давхарга үүсгэдэг. Ашигтай бичил биетэнд сөрөг нөлөөгүй.

Дифенконазол (25г/л) – Энэ нь мөөгөнцрийн эсийн мембраны эргостерол нийлэгжилтийг дарангуйлдаг. Ингэснээр мөөгөнцрийн халдвар урган гарч буй үед урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг зогсоох боломж олгодгоороо давуу талтай.

Тиаметоксам (262,5г/л) – Системийн үйлчлэлтэй. Тариалалтын дараа үр болон таримлын соёололтыг хөрсөнд амьдрах хортон шавжаас хамгаалдаг.

Тиаметоксам нь ургамлын хамгийн эмзэг үе шат буюу ургалтын эхний 30 хоногийн турш үр болон ургамлыг сорох мэрэх амны эрхтэнтэй өргөн хүрээний шавжнуудаас хамгаалдаг. Мөн хөрсөнд амьдардаг төрөл бүрийн өтнөөс хамгаалахаас гадна ургамалд абиотик стрессийг даван туулах чадварыг нэмэгдүүлдэг.Ингэснээр ургамалд:
- Ургамлын амьдрах хувь нэмэгдэх
- Ургамлын үндэсний масс нэмэгдэх
- Ургацын чанар сайжрах зэрэг эерэг үзүүлэлт үзүүлдэг.

Хэрэглэх заавар:

Таримал	Хэрэглэх норм (л/тн)	Ажлын уусмал (л)	Хөнөөлт организм
Төмс, сонгино	0.3-0.4	2-10	**Өвчин**:фузариоз,антракноз,фомоз,цахлай,хар хөл, фитофтор **Шавж**: Утсан өт, колорад цох, шөвгөр хошуут, няслуур цох
Улаанбуудай	1.2-1.5	10	**Өвчин**:фузариозын үндэсний илжрэл, хатуу харуу, тоосон харуу, гельминтоспорозийн илжрэл, **Шавж**:тооноложин цэцэгтний үсрэгч цох, үетний ялаа, нүүгээ цох

Худалдааны нэршил : Сийдгуард

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5ºC) – (+30ºC) 3 жил



Анхаарах зүйлс болон зөвлөмж

1.Тиометоксам-г ашиглаж байгаа үед зөгий болон ашигтай шавжид өндөр хор нөлөө учруулж болзошгүй.
2.Ажиллах үед хоол идэх, ус уух, тамхи татахыг хориглоно. Хүнсний зориулалттай саванд ариутгалын ажлын уусмал найруулж ашиглахыг хориглоно.
3.Ариутгаж боловсруулсан үрийг хүнсний зориулалтаар, мал, амьтны тэжээлд ашиглаж хэрэглэх, зарж борлуулах хориотой. Зөвхөн тарих үрийн материал ариутгах зориулалттай болно.
4.Зөвлөсөн тунг хэтрүүлсэн тохиолдолд үрийн гадаргууг түлж, соёололтын чадварыг бууруулах эрсдэлтэй.
5.Үр идэвхжүүлэгчтэй хэрэглэх тохиолдолд Үр ариутгал + Үр идэвхжүүлэгч гэсэн дарааллаар ажлын уусмал бэлдэнэ.
6.Анхны сав баглаатай 3 жил 0 хэмээс +35 хэмд нарны шууд тусгалаас хол, хүүхэд хүрэхгүй газар хадгалж болно.
7.PVC бээлий, нүүрний хаалт, респиратор (N95 түвшинд) ашиглах
8.Ажил дууссаны дараа гараа савандаж угаах, хувцсаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Үр ариутгал

Үйлчлэх бодис: Тиаметоксам 350г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Шавжийн эсрэг

Тиаметоксамын идэвхтэй нэгдэл нь ургамлын хамгийн эмзэг үе шат буюу ургалтын эхний 30-40 хоногийн турш үр болон ургамлыг сорох мэрэх амны эрхтэнтэй өргөн хүрээний шавжуудаас болон хөрсөнд амьдардаг өтнөөс хамгаалах мөн тааламжгүй орчинд эрүүл ургахад эерэг нөлөө үзүүлдэг. Неоникотинойд бүлгийн шавж устгах бодисууд нь бусад зорилтот бус организмд хор багатай байдаг ба бусад өвчний эсрэг ариутгалтай хамт хэрэглэнэ.



Хэрэглэх заавар:
Тарих үрийн материал шороогүй, хольцгүй байх нь илүү үр дүнтэй.

Таримал	Төлөөлөх гол хортон шавж	Хэрэглэх тун норм кг/га	Ажлын уусмал	Хэрэглэх арга
Тиаметоксам 350г/кг хуурай				
Төмс, Сонгино, Сармис	Буглаа цох, утсан өт, нүүгээ цох, бүүргэнэ, цагаан далавчтан, цикад, колорад цох, сонгины ялаа, өт, тарианы бөөс	0.3-0.6	10-20	Бодисыг (+18ºC) хэмээс (+24ºC) хэмийн усанд уусган ажлын уусмал бэлдэнэ.





Худалдааны нэршил : Тиара

Хүлээх хугацаа: 30 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+35ºC) 4 жил

Өвчний эсрэг фунгицид

Үйлчлэх бодис: Манкоцеб 640г/кг + Мефеноксам 40г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Системийн болон хүрэлцэх үйлчлэлтэй
Таримлын эмгэг өвчний халдвараас гадна дотор талаас хамгаална. Төмсний фитофтор, альтернариоз, бөөрөнхий сонгино, өргөст хэмхийн хуурмаг гау лах өвчинтэй тэмцэх хамгийн сайн үр дүнтэй фунгицид.
Төмсний ургалтын үед бутыг өвчнөөс хамгаалахаас гадна булцууг ч мөн адил эрүүл байлгадаг.
• Мефеноксам нь булцуунд шингэж, өвчний эсрэг дотроос тэмцдэг.
• Манкоцеб нь гадаргуун дээр хамгаалалт үүсгэж, гаднаас өвчин үүсгэгч нэвтрэхийг хориглодог.
• Системийн үйлчлэл нь ургамлын үндэс болон ишээр дамжин бүх хэсэгт тархдаг
• Сонгино, хэмхний навчны хамгаалах давхарга үүсгэж, хуурмаг гуалах өвчнөөс хамгаална.
- Ургамлын амьдрах хувь нэмэгдсэн
- Ургамлын үндэсний масс нэмэгддэг
- Ургацын чанар сайжирдаг





Хэрэглэх заавар:

Таримал	Хөнөөлт организм	Га норм кг/га	Ажлын уусмал	Бусад өвчин
Төмс, лооль	Фитофтор Альтернариоз	1.5-2.0	300-400	Фузариоз, антракноз, фомоз, цахлай, хар хөл
Сонгино, өргөст хэмх	Хуурмаг гуалах			Фузариозын үндэсний илжрэл, хатуу харуу, тоосон харуу, гельминтоспорозийн илжрэл

Худалдааны нэршил : РИДОМИЛ ГОЛД МЦ

Хүлээх хугацаа: 10 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+35ºC) 3 жил

Өвчний эсрэг фунгицид

Үйлчлэх бодис: Азоксистробин 322г/л + Мефеноксам 124г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Ургалтын үе болон хөрсний үйлчлэлтэй
Өвчний 3 үе шатыг бүхэлд нь хянах замаар Rhizoctonia болон Pythium- ийн үрийн материалын өвчлөл, олон төрлийн хөрсөөр халдварлах өвчлөлийг хянах боломжтой. Азоксистробин болон Мефеноксамийн өргөн хүрээний хосолсон үйлчлэл бүхий энэ бүтээгдэхүүн нь үндэсний өвчлөлтүүдээс урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг.



Хэрэглэх заавар:
Эхний шүршилт урьдчилан сэргийлэх, дараагийнх нь 10-14 хоногийн зайтай байна.

Таримал	Хэрэглэх норм л/га	Зориулалт	Хэрэглэх арга	Хүлээх хугацаа давтамж
Төмс	1.3-1.5	Ризоктониоз, мөнгөлөг цахлай, хуурай илжрэл,фитофтор	Ажлын уусмал 80-200 л/га – аар ургамал болон хөрс шүрших. Хөрсийг халдваргүйжүүлдэг.	60 хоногт 1 удаа
Ил талбайн лооль	0.7-0.9	Фузариозын үндэсний илжрэл, питиозын үндэсний илжрэл	Үндэсний хэсэг рүү усалгаа хийх: Эхний усалгаа: 2–3 жинхэнэ навчтай үед, 30–50 мл/ургамал Хоёр дахь: цэцэглэлтийн өмнө, 100–150 мл/ургамал	40 хоногийн зайтай 2удаа хэрэглэх
Сонгино	1-1.25	Фузариозын үндэсний илжрэл	Ажлын уусмал 5000–10000 л/га	14 хоногий зайтай 2 удаа хэрэглэх
Хэмх	0.5-0.9	Фузариозийн үндэсний ялзрал ба хаталт п итиум, фузариум, ризоктониоз үүсгэгчтэй үндэс ба үндэс орчмын ялзрал	Ажлын уусмал 5000–10000 л/га	7 хоногий зайтай 2 удаа хэрэглэх
Тарвас хэмх	1.0-1.5	Үндэсний өвчлөл	Дуслын усалгааны аргаар үндсээр өгөхөд Эхний цацалт: 3–5 жинхэнэ навчтай үед 2дах цацалт: 10–14 хоногийн дараа ажлын уусмал: 5000–10000 л/га	5 хоногий зайтай 2 удаа хэрэглэх

Худалдааны нэршил : Азомеф SE

Хүлээх хугацаа: 10 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-5ºC) – (+35ºC) 3 жил

Өвчний эсрэг фунгицид

Үйлчлэх бодис: Флуазинам 500г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Төмсний талбайн өвчний эсрэг
Төмс, жимс, жимсгэний ургалтын үеийн өвчинтэй тэмцэхэд зориулсан өндөр үр дүнтэй хүрэлцэх үйлчилгээтэй фунгицид. Анхдагч болон хоёрдогч халдварын тархалтыг зогсоож, эрүүл навч, булцууг хамгаална. Усалгаа, хур тунадас ихтэй нөхцөлд угаагдахад тэсвэртэй, тогтвортой.

• Ургамалд фитотоксик нөлөө байхгүй.
• Тарималд хоруу чанар үзүүлэхгүй.
• Үйлдлийн өвөрмөц механизм нь эмгэг төрүүлэгчийн эсэргүүцлийг бий болгохоос сэргийлдэг.
• Усны ууршилт, бороо тэсвэртэй, гадаргууд сайн тогтдог.
• Навчны гадаргуу дээрх эмгэг төрүүлэгч бичил биетэд бэлдмэлийг цацсанаас хойш 2 цагийн дараа үйлчилдэг.
• Хөрсөн дэх өвчний анхдагч халдварыг устган төмсний цухуйцыг хамгаална.





Хэрэглэх заавар: Агаарын хэм (+10ºC) - (+25º)хэмд
Салхины хурд 3 м/с-с илүүгүй байх
Хур тунадас 4 цагын зайтай байх

Таримал	Хөнөөлт организм	Бодисын хэрэглэх тун л/га	Ажлын уусмал	Хэрэглэх арга
Төмс	Фитофтор, Алтернариоз	0.3-0.4	300-400	Бусад өвчний эсрэг бодистой ээлжлэн хэрэглэх зарчмаар 10-14 хоногийн зайтай шүршинэ
Алимны мод	Парша	0.5-0.75	800-1000	

Худалдааны нэршил : ШИРМА КС

Хүлээх хугацаа: 7-14 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+35ºC) 2 жил

Өвчний эсрэг фунгицид

Үйлчлэх бодис: Манкоцеб 640г/кг + Металаксил 40г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Системийн болон хүрэлцэх үйлчлэлтэй
Төмсний фитофтор, альтернариоз, бөөрөнхий сонгино, өргөст хэмхийн хуурмаг гуалах өвчинтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, устгах үйлчилгээтэй фунгицид.

- Шүршилт хийснээс 0,5-1 цагийн дараа ургамалд навч, ишээр нэвтрэн эрт халдвар авсан ургамлыг эмчлэх ба цаашид хамгаалах үүрэг гүйцэтгэдэг.
- Сонгино, хэмхний навчны хамгаалах давхарга үүсэлтийг нэмэгдүүлж, хуурмаг гуалах өвчний эсрэг үйлчлэл үзүүлнэ.



Хэрэглэх заавар:
Эхний урьдчилан сэргийлэх өвчний эсрэг шүршилтийг Ридомил Голд (Манкоцеб 640г/кг + Мефеноксам 40г/кг) бодисоор хийснээс 10-14 хоногийн зайтай Метаксил (Манкоцеб 640г/кг+ Металаксил 40г/кг) бодисыг ээлжлэн хэрэглэх зарчмаар тариалангийн талбайгаа хамгаална.

Таримал	Хөнөөлт организм	Ажлын уусмал	Хэрэглэх арга
Төмс, лооль	2.0-2.5	300-400	Бусад өвчний эсрэг бодистой сэлгэн цацах үр дүнтэй
Сонгино, өргөст хэмх			Өвчний шинж тэмдэг илрэхээс өмнө урьдчилан сэргийлэх зориулалт 2 удаа заавал цацах

Худалдааны нэршил : МЕТАКСИЛ СП

Хүлээх хугацаа: 10 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (0ºC) – (+35ºC) 5 жил

Тарихын өмнө болон уриншийн бодис

Үйлчлэх бодис: Глифосат 540г/л IPA
Аюулын зэрэг: 2 Бага

Зориулалт: Тариалалтын өмнөх нэлэнхүй үйлчилгээтэй
Уринш болон тариалалтын өмнөх, тариалангийн талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг хэрэглэхэд зориулагдсан сонгомол бус, системний үйлчилгээтэй гербицид. Дараагийн сэлгээний тарималд сөрөг нөлөөгүй.
Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм (+10ºC) - (+25º) хэмд
Салхины хурд 4 м/с-с илүүгүй байх
Хур тунадас 4 цагын зайтай байх



Таримал	Хог ургамал	Тун л/га	Ажлын уусмал	Хэрэглэх арга, хугацаа
Уриншид	Нэг ба олон наст үет, Нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамал	2.0-3.0	200-300	Нэг наст хог ургамлын ургалтын эхэн үед, зарим олон наст хог ургамлын ургалтын эрчимтэй үед (мөлхөө хиаг, азарганы 10-15см өндөр ургасан үед)
Бүх төрлийн зусах таримлын тарихаас өмнө (үр тариа, төмс, буурцагтан, тэжээлийн ургамал)	Нэг наст үет болон хос үрийн талт хог ургамал	1.4-2.5		Тарихаас өмнө болон таримал соёолохоос өмнө, хог ургамлын ургалтын хугацаанд зуны сүүл, намар тариа хураасны дараа
	Олон наст үет хос үрийн талт хог ургамал	2.5-3.5		
ХАА-н зориулалтын бүс (хамгаалалтын бүс, гудамж төмөр замын ойролцоох газар, нисэх онгоцны зурвас, үйлдвэрлэлийн нутаг дэвсгэр)	Нэг наст ба олон наст үет хог ургамал, Хос үрийн талт хог ургамал	1.4-2.8		Зохимжгүй хог ургамал устгана (шарилж, лууль г,м) Гербицид хэрэглэсэн талбайд 15 хоногийн турш хүн байлгахыг хориглоно
	Бүх төрлийн өвслөг хог ургамал	2-3		
	Харьцангуй тэсвэртэй өвслөг хог ургамал	3-3.5		

Худалдааны нэршил : РАУНДАП IPA

Хүлээх хугацаа: 30-60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (0 С) – (+25 С) 3 жил

Төмсний хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Метрибузин 480 г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Төмсний талбайн сонгомол үйлчилгээтэй
Төмс, эрдэнэшишийн тариалалт хийсэн талбайд сонгомол үйлчлэлтэй
Нэг болон зарим олон наст хос үрийн талт ба зарим үет хог ургамлын эсрэг хэрэглэх сонгомол үйлчлэлтэй соёололтын өмнө ба соёололтын дараа хэрэглэх гербицид. Бодис нь ургамалд амархан шингэдэг.
Хөрсний үйлчлэлтэй:
Мөн хөрсний гадаргууд гербицидийн бүрхүүл үүсгэн, шинээр ургах хог ургамлыг дарангуйлдаг. Хөрс чийгтэй үед үйлчлэлээ удаан хадгална.
Цаг хугацаа алдалгүй хэрэглэж хог ургамлыг устгаснаар фитофтор өвчин гарахаас сэргийлдэг.



Таримал	Хог ургамал	Тун (л/га)	Ажлын уусмал (л/га)	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс	**Нэг наст хос үрийн талт**: Лууль Урвуу гагадай Чөдөр тарна Шувуун тарна Зэрлэг манжин	0.6-0.8	100-200	Таримал цухуйхын өмнө болон 5 см хүртэл өндөр байх үед 2 удаа
		1.1-1.4		Төмсний бут 5см өндөр байх үед шүршинэ.
Ил талбайн лооль	**Олон наст** хос үрийн талт: Эмийн багваахай Хөдөөгийн шаралзгана	0.4-0.8	200-300	Таримал 1-2 навчтай байхад эхний удаа,дараа нь 2-4 навчтай болсон үед
		1.2-1.5		
Хамгаалагдсан хөрсний лооль	**Үет хог ургамал:** Усан хоног будаа Бог будаа Хошуу будаа	1.7	400	Үрслэг хөрсөнд шилжүүлж суулгаснаас хойш 17-20 хоногийн дараагаас шүршинэ.

Худалдааны нэршил : Потатосейф SC

Хүлээх хугацаа: 14-21 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +30°C)-т 2 жил

Төмсний хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Метрибузин 700 г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Төмсний талбайн сонгомол үйлчилгээтэй
Төмсний талбайн нэг болон хоёр наст хос үрийн талт ба зарим үет хог ургамлын эсрэг хэрэглэх сонгомол үйлчилгээтэй соёололтын өмнө ба соёолсны дараа хэрэглэх гербицид. Бодис нь ургамалд амархан шингэдэг. Хөрсний гадаргууд гербицидийн бүрхүүл үүсгэн, шинээр ургах хог ургамлыг дарангуйлдаг. Цацах үед хөрс чийгтэй байвал үйлчлэлээ сайн хадгална. Цаг хугацаа алдалгүй хэрэглэж хог ургамлыг устгаснаар фитофтор өвчин гарахаас сэргийлнэ.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+10ºC) - (+25ºC)
Салхины хурд: 3 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх

Таримал	Хог ургамал	Тун (кг/га)	Ажлын уусмал (л/га)	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс	Нэг наст хос үрийн талт: Лууль, урвуу гагадай, чөдөр тарна	0.7-1.4	200-300	Таримлыг соёолж гарч ирэхээс өмнө хөрсөнд шүршүх
	Шувуун тарна, зэрлэг манжин	0.8-1.0		Таримал 5 см-с дээш ургах үед
	Эгэл гаймуу, өрөмтүүл	0.7-0.8		Таримал 5 см-с дээш ургах үед
Хамгаалагдсан хөрсний лооль	Олон наст үрийн талт: Эмийн багваахай, хөдөөгийн шаралзгана	0.8-1.0		Таримлыг соёолж гарч ирэхээс өмнө хөрсөнд шүрших
	Үет хог ургамал: Бог будаа, хошуу будаа, Тарианы хар будаа	1		Таримал 3-4 навчтай байх үед давтан шүрших

Худалдааны нэршил : ЛАЗУРИТ СП

Хүлээх хугацаа: 30-60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +40°C)-т 3 жил

Төмсний хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Римсульфурон 500г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Төмсний талбайн сонгомол үйлчилгээтэй
Төмс, эрдэнэшиш, улаан лоолийн талбайн нэг ба олон наст үет хог ургамал, зарим хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг соёололтын дараа хэрэглэдэг сонгомол үйлчилгээтэй системийн гербицид. Бүх үет хог ургамлын зүйлүүд (хиаг) ихэнх хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг өргөн хүрээнд үйлчилдэг.
5-7 хоногийн дараа гербицид цацсан хог ургамлын өсөлт хөгжилт мэдэгдэхүйц саатдаг. Хог ургамлын бүрэн үхэлт 3-4 долоо хоногийн дараа явагддаг. Талбайг 3-4 долоо хоногийн турш хог ургамлаас хамгаална.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+15ºC) - (+25º C)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх
Римсульфурон + Адью гадаргуугийн идэвхүүлэгч бодистой хамт хэрэглэх нь хог ургамалд өндөр үр дүнтэй үйлчилдэг. Хөрс болон агаарын гантай нөхцөлд үет хог ургамалын эсрэг ажлын уусмалын хэмжээг 300л/га (Адью 0.3 л/га) тунгаар хэрэглэнэ.
Тарианы хар будаатай талбайд Римсульфурон бодисыг 25г/га-аар тооцно.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун г/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга
Төмс	Лууль, Урвуу гагадай, Чөдөр тарна, Шувуун тарна,	Римсульфурон 15-25гр + Адью/ Смартвэт 0.2	200-300	Маналт явсны дараа
Улаанлооль	Зэрлэг манжин, эгэл гаймуу өрөмтүүл, эмийн багваахай, хөдөөгийн шаралзгана, бог будаа, хошуу будаа, тарианы хар будаа	Римсульфурон 25гр + Адью/ Смартвэт 0.25		Үрслэг шилжүүлснээс 2-3 долоо хоногийн дараа

Худалдааны нэршил : ЭСКУДО ВДГ

Хүлээх хугацаа: 20-30 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-30°C) +30°C)-т 3 жил

Луувангийн хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Прометрин 500г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Төмсний талбайн сонгомол үйлчилгээтэй
Лууван, төмс, наранцэцэг зэрэг таримлын нэг наст хос үрийн талт зарим үет хог ургамлын эсрэг сонгомол үйлчилгээтэй гербицид. Бэлдмэлийг хавар таримлыг соёолохын өмнө болон соёолсоны дараа хэрэглэхэд хог ургамлын иш, навчаар дамжин үндэсний системд тархаж, фотосинтезийн процессийг дарангуйлж устгадаг.

• Таримлыг соёолохоос өмнө хог ургамлын 2 навч үүсэхээс өмнө хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй.
• Цацалтын дараа мөр хоорондын сийрүүлэлт хийхээс зайлсхийх, зайлшгүй шаардлагатай үед 3 см-ээс илүүгүй гүнд сийрүүлнэ.
• Таримлын сэлгээнд нөлөөлөхгүй.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+15ºC) - (+20ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх
Агаарын температур +10 градусаас доош байх тохиолдолд бодисын үйлчлэлийн нөлөө буурна. Ургамал хамгаалах бодисыг цацах үед хөрс сайн чийг авдаг. Хөрсний механик бүтэц хүнд байвал дээд тунгаар, хөнгөн хөрсөнд бага тунгаар тус тус хэрэглэнэ. Хүлэрхэг хөрсөнд бэлдмэл нь маш сайн үр дүн өгдөг.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Лууван	Софийн борбут, ацан ажигана, намуугийн зүйл, луулийн зүйл, эгэл гаймуу, өрөмтүүл, сүүт өвс, тарианы хар будаа, хээрийн нил, хөдөөгийн бирааги	1.5	200-300	Тариалалт хийхээс өмнө эсвэл үрийг соёолж гарч ирэхээс өмнө эсвэл таримлын жинхэнэ 2-3 навчтай үед цацах
Вандуй		1.5-3.0		Тариалалт хийхээс өмнө эсвэл үрийг соёолж гарч ирэхээс өмнө хөрсөнд цацах
Шар буурцаг		2.5-3.0		
Төмс		2.5-3.5		
Эрдэнэшиш		2.0-3.5		
Наранцэцэг		2.5-3.5		

Худалдааны нэршил : ГЕЗАГАРД КС

Хүлээх хугацаа: 30-45 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-5°C) +35°C)-т 3 жил

Сонгино, сармисны хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Пендиметалин 330г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Сонгино, сармисны талбайн соёололтын өмнөх

Төл болон хар үрээр тариалсан сонгинын талбайд тарилтын дараа, таримлын соёололтын өмнөх хөрсний бүрхүүл үүсгэн нэг наст үет, зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамлын соёололтыг хязгаарлах, соёолж гарч ирсэн хог ургамлыг устгах үйлчилгээтэй зааврын дагуу хэрэглэх гербицид. Цаг агаарын тааламжтай нөхцөлд 9 долоо хоногийн турш үйлчилдэг.

• Таримлыг соёолохоос өмнө хог ургамлын 2 навч үүсэхээс өмнө хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй.

• Цацалтын дараа мөр хоорондын сийрүүлэлт хийхээс зайлсхийх, зайлшгүй шаардлагатай үед 3 см-ээс илүүгүй гүнд сийрүүлнэ.

• Таримлын сэлгээнд нөлөөлөхгүй.



Хэрэглэх заавар:

Агаарын хэм: (+10ºC) - (+25ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх

Бэлдмэлийн зарцуулах хэмжээ нь хөрсний механик бүтэц, ялзмагийн найрлага зэргээс шалтгаална. Ялзмаг ихтэй хатуу хөрсөнд тунадас бага унасан, агаарын температур өндөр үед хамгийн өндөр тунгаар хэрэглэнэ. Зөөлөн болон ялзмаг багатай чийг хангалттай хөрсөнд бага тунгаар хэрэглэнэ.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төл сонгино Хар үрээр тариалалт хийсэн сонгино	Гандбадраа, чөдөр тарна, тарнын зүйлүүд софийн бут, таримал олс, намуугийн зүйл, луулийн зүйл, нэг наст биелэг, эгэл гаймуу, өрөмтүүл, хээрийн нил, гагадайн зүйл, хөдөөгийн бирааги, маж, тарианы хар будаа, имт гичгэнэ	2.3-4.5	200-300	Тариалалтын дараа таримлыг соёолохоос өмнө хөрсөнд шүрших, Хог ургамлын ургалтын эхэн үед мөн соёолохоос өмнө хөрсөнд шүршинэ
Лууван		2.3-4.5		
Наранцэцэг		4		

Хүлээх хугацаа: 40-49 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (0°C) +40°C)-т 3 жил

Худалдааны нэршил : Эстамп

Сонгино, сармисны хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Ацетохлор 22% + Оксифлоурфен 5% + Пендиметалин 17%
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Сонгино сармисны талбайн
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь пендиметалин, оксифлуорфен, ацетохлор агуулсан сармисны талбайд хэрэглэх гербицид бөгөөд сармисны талбайд ургадаг өргөн навчит болон нарийн навчит нэг наст хог ургамлуудыг өргөн хүрээнд, найдвартай хянах зориулалттай.
Сармис, жимс ногооны талбай, цагаан гаа, сонгинын тариалалтад хэрэглэх боломжтой ба талбайн ургацад аюулгүй бүтээгдэхүүн юм.



Хэрэглэх заавар:

Таримал	Зориулалт	Хэрэглэх норм л/га	Ажлын уусмал л/га
Сармис	Сонгино, саримсны талбайн хог ургамлын эсрэг хэрэглэх хөрсний гербицид	2.25-3.0 л/га	400-600л/га





Худалдааны нэршил : Онионсейф ЕС

Хүлээх хугацаа: 60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-15°C) +35°C)-т 3 жил

Сонгины хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Оксифлуорфен 240г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Сонгино, сармисны талбайн соёололтын өмнөх

Сонгино, саримс тариалсан талбайн сонгомол үйлчлэлтэй гербицид.

Сонгино, саримс ба наранцэцгийн таримлын ургалтын үед талбай дахь нэг наст хос үрийн талт болон зарим үет хог ургамлын эсрэг тэмцэх үйлчилгээтэй ба тухайн тарималдаа хөнөөлгүй гербицид.

Хөрсний гадаргууд хог ургамлын соёололт хязгаарлах зориулалттай гербицид.

Соёололтоос өмнө хөрсний гадаргууд хамгаалах үе үүсгэх зориулалтаар хог ургамлыг дарангуйлдаг. Хөрсний хатуу хэсэгт нэвчин орж, амархан угаагддаггүй тул дараагийн мөр хоорондын сийрүүлэлт хийх хүртэл таримлын талбайг хог ургамлаас хамгаалдаг. Гербицидийн үйлчилгээ шүршсэнээс 2-3 хоногийн дараа хог ургамлыг гэмтээж 1-2 долоо хоногийн дотор устдаг. Талбайн хөрс боловсруулалтын байдлаас хамаарч гербицид хөрсөнд хэр удаан хадгалагдах нь хамаарна. Ургац хураалтаас хойш гербицид бүрэн задарч дараагийн ээлжлэн тариалалтад ямар нэгэн хор нөлөөгүй байдаг.



Хэрэглэх заавар:

Агаарын хэм: (+10ºC) - (+25ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх

Хөрс цаг уурын ямарч нөхцөлд үр дүн нь тогтвортой сайн. Гэмтэж өвчилсөн, гаднын нөлөөнд (ган, хяруу, үер мөн өвчин хортонд болоод пестицидийн хоронд хүчтэй нэрвэгдсэн) дөрөйтсон ургамалд хэрэглэж болохгүй.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Сонгино саримс	Чөдөр тарна софийн борбут ноцогоно 1 наст биелэг өвс, хогжуу өрөмтүүл, урвуу гагадайч, чөдөр тарна, хонгио хошуу будаа ,хөдөөгийн шаралзгана	0.5-1.0	200-300	Таримлын 2 навчтай үед – 0.5л/га –аар таримлын 4 навчтай үеэс дээд тунгаар хэрэглэж болно

Худалдааны нэршил : ГОАЛ 2Е, КЭ

Хүлээх хугацаа: 40-49 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (0°C) +40°C)-т 3 жил

Хүрэн манжингийн хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Десмедифам 70г/л + Фенмедифам 90г/л + Этофумеза 110г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Хүрэн манжингийн талбайн сонгомол үйлчилгээтэй

Чихрийн манжин, хүрэн манжин, тэжээлийн манжингийн талбайн нэг наст хос үрийн талт, зарим үет хог ургамлын эсрэг таримлын соёололтын дараа хэрэглэдэг сонгомол үйлчилгээтэй гербицид.

3 төрлийн үйлчлэх бодисын агууламжтай тул өргөн хүрээний (40 гаруй зүйл) хог ургамалд нөлөөлдөг. 2-7 хоногийн дараа үйлчилгээ мэдэгдэж эхлээд, 2-3 долоо хоногт хог ургамал бүрэн үхдэг. Хог ургамлын үе шатуудад тунг давтамжтай хийвэл илүү үр дүн үзүүлдэг.



Хэрэглэх заавар:

Агаарын хэм: (+5ºC) - (+25ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх
Өвчин хортонд нэрвэгдсэн, гундсан таримал ургамал дээр хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Чихрийн манжин	Гагдайн төрлүүд царвант шарилж, хээрийн цагаан гич, цагаан лууль, эгэл гаймуу, эгэл халгай, хээрийн бирааги гичгэнэ, зэрлэг цагаан лууван, хөдөөгийн бирааги зангуу	1	150-200	Бүх үе шатанд 7-14 хоногийн зайтайгаар хэрэглэнэ
Хүрэн манжин		1.5		Таримлын 2-4 жинхэнэ навчтай үе шатанд хог ургамлын 1 2р дэгдэлтийн үед 7-14 хоногийн зайтайгаар хэрэглэнэ. Таримал жинхэнэ навчтай үеэс 3.0л/га-аар хэрэглэж болно
Тэжээлийн манжин		3		Таримлын 4 жинхэнэ навчтай үе шатанд хог ургамал нялх байхад 1 удаа хэрэглэнэ.
Гурвалжин будаа		0.75		Таримлын жинхэнэ 1-2 навчтай үе шатанд хэрэглэнэ.

Худалдааны нэршил : БИЦЕПС ГАРАНТ КЭ

Хүлээх хугацаа: 60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +40°C)-т 3 жил

Хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Хизалофоп-П-Этил 125г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Нэг ба олон наст үет хог ургамалын эсрэг
Тариалангийн талбайн нэг ба олон наст үет хог ургамлын эсрэг тэмцэхэд зориулагдсан сонгомол үйлчилгээтэй соёололтын дараах гербицид.

• Хог ургамлын навч, ишээр бусад эд эрхтнүүдэд маш хурдан шингэж, үндэслэг иш болон нахианы өсөлтийн цэгт очиж үйлчилдэг системийн идэвхтэй үйлчилгээтэй

• Гербицид хэрэглэснээс хойш 7-10 хоногийн дараа хог ургамлын өсөлт зогсонги байдалд орсноор гэмтлийн шинж тэмдэг ажиглагддаг. Цаг агаарын байдлаас хамаарч 2-3 долоо хоногийн дараа ургамлыг үхэлд хүргэнэ.

• Бараг бүх зүйлийн үет хог ургамлыг устгадаг.

• Таримал ургамлын хөгжлийн ямарч үе шатанд хэрэглэх боломжтой.

• Хос үрийн талт хог ургамлын бусад гербицидтэй хольж хэрэглэхэд зохицол сайтай.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+8ºC) - (+25ºC)
Салхины хурд: 3 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх
Өвчин хортонд нэрвэгдсэн, гундсан таримал ургамал дээр хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс Лууван Сонгино Байцаа Вандуй	Мөлхөө хиаг, нэг наст биелэг, хонгио хошуу будаа, хоног будааны зүйл, тарианы хар будаа, бэрмэг, тагийн шиш, сибирь хялгана, биелэг өвс, ердийн зэгс, үнэгэн сүүл, газрын согоо, усан хоног элээ, хар дагуур сульхиаг, сибирь сульхиаг ,бага хургалж, хонин ботууль	0.4-1.2	100-200	Хог ургамлыг 2-4 навчтай болсон үеэс хэрэглэнэ
				Мөлхөө хиагийг 10-15 см өндөр болсон үед цацна
Маалинга				Тарималыг 2-4 навчтай болсон үеэс хэрэглэнэ
Рапс				Нэг наст хог ургамлыг 2-4 навчтай болсон үед
				Мөлхөө хиагийг 10-15 см өндөр болсон үед цацна

Худалдааны нэршил : Миура КЭ

Хүлээх хугацаа: 60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-15°C) +35°C)-т 3 жил

Хог ургамлын гербицид

Үйлчлэх бодис: Клетодим 240г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Нэг ба олон наст үет хог ургамалын эсрэг
Төмс, шар лууван, рапс, шар буурцаг, сонгины талбайн нэг наст үет (хоног будаа, тарианы хар будаа, зэрлэг бог будаа) болон олон наст үет хог ургамлын (хиаг, цагаан хялгана, жугар) эсрэг системийн үйлчилгээ үзүүлж ургамлын дээрхи болон үндэсний системд хүрч хог ургамлыг бүрэн устгадаг

• Хог ургамлын навч, ишээр бусад эд эрхтэнүүдэд маш хурдан шингэж, үндэслэг иш болон нахианы өсөлтийн цэгт очиж үйлчилдэг системийн идэвхтэй үйлчилгээтэй.

• Гербицид хэрэглэснээс хойш 7-10 хоногийн дараа хог ургамлын өсөлт зогсонги байдалд орсноор гэмтлийн шинж тэмдэг ажиглагддаг. Цаг агаарын байдлаас хамаарч 2-3 долоо хоногийн дараа ургамлыг үхэлд хүргэнэ.

• Хос үрийн талт хог ургамлын бусад гербицидтэй хольж хэрэглэхэд зохицол сайтай.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+0ºC) - (+20º C)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 6 цагийн зайтай байх

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс Шар Лууван, Сонгино, Рапс, Шар буурцаг	Нэг наст биелэг, хонгио хошуу будаа, хоног будааны зүйл, тарианы хар будаа, үнэгэн сүүл, мөлхөө хиаг	0.4-1.2	100-200	Таримлын ургалтын үе шатаас үл хамааран 1 наст үет хог ургамлын 2-6 навчтай үед, олон наст хог ургамлын (мөлхөө хиаг) 10-15 см өндөр үед зааврын дагуу хэрэглэнэ



Худалдааны нэршил : Клетомекс



Хүлээх хугацаа: 60 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-15°C) +35°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Тиаметоксам 250г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Шавжийн эсрэг (Утсан өтний эсрэг)

Шавжийн төв мэдрэлийн систем дэх никотиний ацетилхолин рецептортой холбогдож, мэдрэлийн системийг хэт өдөөж, улмаар саажилт, үхэлд хүргэдэг. Неоникотинойд бүлгийн шавж устгах бодисууд нь хүн болон бусад зорилтот бус организмд хор багатай байдаг. Ургамлын сорох мэрэх амны эрхтэнтэй өргөн хүрээний шавж болох бөөс, навчит цохнууд, болон бусад төрлийн цох түүний авгалдай, эрвээхэй, түүний авгалдайны бүх үе шат, цагаан далавчтан зэргээс гадна хачиг, шоргоолж зэрэг олон төрлийн хөдөө аж ахуйн хортон шавжийг онилдог.



Хэрэглэх заавар:

Таримал	Төлөөлөх гол хортон шавж	Хэрэглэх тун норм кг/га	Ажлын уусмал	Хэрэглэх арга
Төмс	Утсан өт, Колорад цох, Няслуур цох, хөрсөнд амьдрах чадвартай хортон	0.06	200-400	Ургалтын үед урьдчилан сэргийлэх болон шавж үзэгдэж эхэлсэн үеэс хэрэглэх
Сонгино, сармис	Сонгины ялаа, сонгины өт	0.3-0.6		
Байцай	Ялаа бүүргэнэ (үсрэгч цох)	0.3	10000	Үрслэг шилжүүлэн суулгахаас 1-2 хоногийн өмнө талбайд цацна. Бодис цацахаас өмнө усалгаа хийхгүй байх
Хэмх (ил талбай)	Тамхины цацаг далавчтан, бөөс, цагаан далавчтан	0.8	200-400	Ургалтын үед навчаар
		0.12	2500-5000	Усалгааны системээр
Хэмх (хамгаалагдсан хөрс)	Тамхины цацаг далавчтан, бөөс, цагаан далавчтан	0.8		Дуслын усалгааны системээр таримал 1 метрээс бага үед
		0.4		Дуслын усалгааны системээр таримал 1 метрээс бага үед
Лооль	Колорад цох	0.8	200-400	Ургалтын үед навчаар
	Бөөс, цагаан далавчтан	0.12	2500-5000	Усалгааны системээр
Лооль, хаш	Бөөс, цагаан далавчтан	0.8		Дуслын усалгааны системээр таримал 1 метрээс бага үед
		0.4		Дуслын усалгааны системээр таримал 1 метрээс бага үед

Худалдааны нэршил : Актара ВДГ

Хүлээх хугацаа: 30 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+35ºC) 4 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Имидаклоприд 150г/л + Лямбда цигалотрин 50г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Хог ургамлын соёололтын эсрэг хөрсний гадаргууд бүрхүүл үүсгэх
Үйлчлэх механизм нь хортон шавжид хүрэлцэх болон хоол боловсруулах эрхтний замаар өөр төрлийн идэвхитэй бодисыг хослуулан агуулсан инсектицид.

- Олон төрлийн таримал дээр өргөн хүрээний хортонд үйлчилдэг.
- Ургамалд хуримтлагддаггүй, байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөө бага
- Богино хугацаанд 'нок даун' үйлчилдэг.
- Дайжуулах үйлчилгээтэй.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+10ºC) - (+30ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 3 цагийн зайтай байх

Таримал	Хөнөөлт организм	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс, ил хөрсний улаан лооль	Колорадын цох хорхой	0.08-0.12	200-400	Дайжуулах зорилгоор болон ургалтын бүх үе шатанд хэрэглэнэ.
Сонгино	Сонгины ялаа	0.2-0.5		
Лууван	Луувангийн ялаа	0.12-0.2		
Байцааны үрслэг	Байцааны эрвээхэй, байцааны цагаан эрвээхэй, манжингийн цагаан эрвээхэй, байцааны бөөс, загалмай цэцгийн бөөс	0.1-0.14	300-400	
Байцаа үрээр	Бүүргэнэ, шөвгөр хошуут цох, ургамлын бөөс, манжингийн цагаан эрвээхэй	0.1-0.12	100-200	
Байцаа үрээр	Царцаа	0.1-0.15	300-400	

Худалдааны нэршил : БОРЕЙ СК

Хүлээх хугацаа: 28 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-5°C) +35°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Лямбда-цигалотрин 50г/л
Аюулын зэрэг: 2 Дунд

Зориулалт:
Бэлчээр ойн хортон болон үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний хортон, агуулахын хөнөөлт шавж, хачигтай тэмцэхэд хэрэглэнэ. Хортон шавжид хүрэлцэх болон хоол боловсруулах эрхтний замаар үйлчилнэ.

- Олон төрлийн таримал дээр өргөн хүрээний хортонд үйлчилдэг
- Ургамалд хуримтлагддаггүй, байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөө бага
- Богино хугацаанд “нок-даун” үйлчилдэг
- Дайжуулах үйлчилгээтэй



Хэрэглэх заавар:
Таримал ургамал, бэлчээрт хөнөөлт шавж олшрох үед шүршинэ.Бодисын үйлчилгээний хугацаа шавжийн төрөл болон цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч 2-3 долоо хоног байна.

Таримал	Шавж	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Байцаа	Байцааны хивэн, Эрвээхийний хүрэнцэр, тооноложин	0.05	200-400	Талбайд ургалтын хугацаанд 1 удаа хэрэглэнэ
Төмс	Буглаа цох, бясаа, царцаа	0.2		
Сонгино	Сонгины ялааны авгалдай	0.15-0.2	200-300	25 хоногийн зайтай ургалтын хугацаанд 2 удаа хэрэглэж болно
Бэлчээр	Царцаа, нугын бор эрвээхий	0.1-0.2	200-400	Хөнөөлт шавж олшрох үед хэрэглэнэ
Үхрийн нүд	Бөөс, Хачиг, навчит шавж	0.15-0.2	800-1200	Ургалтын хугацаанд шавж идэвхтэй тархалтын үед 2 удаа

Худалдааны нэршил : Каратэ МКС

Хүлээх хугацаа: 20-30 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +35°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Альфа-циперметрин 100г/л
Аюулын зэрэг: 2 Дунд

Зориулалт: Тариалангийн талбайн
Төмс, хүнсний ногоо ба бусад хөдөө аж ахуйн тарималд хөнөөл учруулдаг хортон шавжтай (бөөс, цацаг далавчтан, цикад, царцаа, шөвгөр хошуут цох, үетний ялаа, нөмрөгт бясаа, рапсын цэцэгч цох, тоонолжин цэцэгтийн бүүрэг, манжингийн бөөс, манжингийн навч хөндийлөгч, ялаа, вандуйн үрч цох, вандуйн бөөс, бясаанууд, царцаа) тэмцэх, урьдчилан сэргийлж дайжуулах үйлчилгээтэй инсектицид. Энэ нь шавжийн төв мэдрэлийн системийг гэмтээж эсийн мембраны нэвтрүүлэх чадварыг алдагдуулж, натрийн сувгийг хаадаг. Шавжийг хурдан үхэлд хүргэнэ.



Хэрэглэх заавар:
Таримал ургамал, бэлчээрт хөнөөлт шавж олшрох үед шүршинэ.
Бодисын үйлчилгээний хугацаа шавжийн төрөл болон цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч 2-3 долоо хоног байна.

Таримал	Хөнөөлт организм	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га
Байцаа Манжин	Манжингийн цагаан эрвээхэй, Бүүргэнэ, Бүгэг эрвээхэй, Ургамлын бөөс, Навчны ширх ялаа	0.1-0.15	100-300
Төмс, лууван	Клорад цох, Буглаа цохнууд		
Эрдэнэшиш	Цикад, нугын бор эрвээхэй	0.1-0.2	200-400

Худалдааны нэршил : ФАСКОРД КЭ

Хүлээх хугацаа: 20 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-15°C) +30°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Эсфевалерат 50г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Байцаа манжингийн талбайн шавжийн эсрэг
Мэрэх болон сорох амны эрхтэнтэй хортон шавжуудад хүрэлцэх болон хоол боловсруулах замаар богино хугацаанд дайжуулах, хордуулах, үхүүлэх үйлчилгээтэй.
• Хортон шавжийг богино хугацаанд үхүүлдэг
• Давхар дайжуулах үйлчилгээтэй
• Нас бие гүйцсэн шавж, өт, авгалдайд адил үйлчилнэ



Хэрэглэх заавар:
Навчны гадаргууд тогтдог, ургамалд шингэхгүй тул бэлдмэлийг хур тунадас унаагүй үед, хурц наргүй өдөр өглөө оройн тогтуун цагаар ургамалд шүршилт хийх аргаар, хортны тоо толгой хэт олширсон тохиолдолд хэрэглэнэ.

Таримал	Хог ургамал	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Байцаа, Манжин	Байцааны болон манжингийн цагаан эрвээхий, бүгэг эрвээхий, хивэн эрвээхий	0.2	200-400	Таримлын ургалтын хугацаанд 30 хоногт 1 удаа





Худалдааны нэршил : СЭМПАЙ КЭ

Хүлээх хугацаа: 30 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +35°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Имидаклоприд 220г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Тариалангийн талбай, хүлэмж бэлчээрийн шавжийн эсрэг
Таримлын талбайн төрөл бүрийн хортон шавжтай тэмцэхэд зориулсан системийн үйлчилгээтэй инсектицид. Ургамлын бөөс, трипс, цагаан далавчтан зэрэг шавжаас гадна навч идэгч бүх төрлийн шавжид өргөн хүрээтэй үйлчилдэг. Навчинд шүршилт хийх, ургамлын орчим хөрсөнд хийх зэргээр хэрэглэнэ. Шавжийн төв мэдрэлийн системд үйлчилдэг, хөхтөн амьтдад бага хоруу чанартай байдаг.

Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: +12ºC - +25ºC
Салхины хурд: 4м/с- ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 4 цагийн зайтай байх



Таримал	Хөнөөлт организм	Хэрэглэх бодисын тун л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс	Колорад цох, бясаа бөөс, буглаа цохнууд	0.25	200-300	Ургалтын үед хэрэглэнэ
Хэмх Лооль Чинжүү Хаш	Тоорын бөөс гуатны бөөс, трипс, цагаан далавчтан, төмсний бөөс, манжингийн бөөс	0.3	300	
Чимэглэлийн ургамал	Бөөс, трипс, цагаан далавчтан, цох	0.04-0.08	100	
Чацаргана Үхрийн нүд	Ургамлын бөөс, бясаа, ялаа	0.25		Шавж үзэгдэж эхэлсэн цэгаас мод руу шүрших

Хүлээх хугацаа: 25 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +30°C)-т 3 жил

Шавжийн эсрэг инсектицид

Үйлчлэх бодис: Имидаклоприд 700г/кг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Тариалангийн талбай, хүлэмж бэлчээрийн шавжийн эсрэг

Таримлын талбайн төрөл бүрийн хортон шавжтай тэмцэхэд зориулсан системийн үйлчилгээтэй инсектицид. Ургамлын бөөс, трипс, цагаан далавчтан зэрэг шавжаас гадна навч идэгч бүх төрлийн шавжид өргөн хүрээтэй үйлчилдэг. Навчинд шүршилт хийх, ургамлын орчим хөрсөнд хийх зэргээр хэрэглэнэ. Шавжийн төв мэдрэлийн системд үйлчилдэг, хөхтөн амьтдад бага хоруу чанартай байдаг.



Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: +12ºC - +25ºC
Салхины хурд: 4м/с- ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 3-4 цагийн зайтай байх

Таримал	Хөнөөлт шавж	Хэрэглэх бодисын тун кг/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх арга, хугацаа
Төмс	Колорад цох, бясаа бөөс, буглаа цохнууд	0.05-0.125	200-400	Ургалтын үед хэрэглэнэ
Төмс(өрхийн хэрэглээнд)		0.3г буюу (3г-н 10/1)	5л ус-100мкв газар шүрших	
Хамгаалагдсан хөрс (хэмх лооль)	Ургамлын бөөс, цагаан далавчтан трипс	0.15-0.45	200-400	Усалгааны системээр 1000-3000л ус
Бэлчээр	Царцаа	0.15-0.3		Агаарын шүршигчээр 25-50л/га-аар ажлын уусмалын зарцуулалт тооцно
Модлог ургамал	Ургамлын бөөс, бясаа, ялаа	0.06		Урьдчилан сэргийлэх болон шавж үзэгдсэн үеэс хэрэглэнэ

Хүлээх хугацаа: 25 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10°C) +30°C)-т 3 жил

Хивэн эрвээхийн эсрэг био бэлдмэл

Үйлчлэх бодис: Bacillus thuringiensis var.курстаки 16000 IU/мг
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) нь хөрсөнд байгалиасаа оршдог бактер бөгөөд навчаар хооллодог хортон шавьжуудыг (жишээлбэл: трипс, царцаа эрвээхэйн авгалдай, байцааны навч идэгч (cabbage looper), улаан лоолийн эвэрт хорхой болон бусад навч идэгч авгалдай, харсан далавчтан болон тэдгээрийн өндөг, хүрэнцэр) мод, бут сөөг, улаан лооль, байцаа зэрэг хүнсний ногоон дээр хянахад нэн тохиромжтой.
Хамгийн үр дүнтэй үе нь шавжийн эхний болон хоёрдугаар авгалдайн (хүрэнцэр) үед буюу тэдгээр нь жижиг байх үе шатанд хэрэглэгдсэн тохиолдолд илэрдэг. Энэхүү бэлдмэлийг шавьж заавал идэж байж үйлчилдэг бөгөөд гэдэсний хордлогын замаар устгал явагддаг.



Давуу тал:
- Хортон шавьжийг халдварлуулж устгах,
- Хооллолтыг нь зогсоох,
- Өндөглөлтийг саатуулах,
- Хортон шавжийг ургамал руу татагдах сонирхлыг бууруулж, өөр газар шилжин холдох нөхцөл бүрдүүлдэг

Хэрэглэх заавар :

Таримал	Хэрэглэх тун (л/га)	Хөнөөлт организм	Хэрэглэх арга, хугацаа
Улаанбуудай, рапс	1-1,5кг/га	Хайрсан далавчтан, байцааны өт, бүгэг эрвээхэй, хивэн эрвээхэй, цагаан эрвээхэй, хос далавчтан, трипс, навч ороогч	Авгалдай 3р шатанд хүрэхээс өмнө хэрэглэнэ.
Цэцэгт ногоо байцаа, төмс, манжин	375-750г/га		Өндөг бойжих болон залуу авгалдайн үед
Эрдэнэшиш улаан лооль, өргөст хэмх	750-1500г/га		Өндөг бойжих үеэс эхний 1-2р шатны авгалдайд

Худалдааны нэршил : Bacillus thuringiensis var.курстаки (Btk)

Хүлээх хугацаа: 20 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-30°C) (+30°C)-т 2 жил

Гадаргуугийн идэвхжүүлэгч

Үйлчлэх бодис: Трисилоксан этоксилат
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт: Пестицидийн болон ураншийн бодисын үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх
Пестицид болон уриншийн бодис, навчны бордоотой хамт хэрэглэхэд навчин дээр буух ажлын уусмалын шингэлт, нэвчилтийг сайжруулснаар бодис болон бордооны ашиглалтыг нэмэгдүүлдэг. Силикон суурьтай гадаргуугийн идэвхт бодис нь олон давуу талтай:
• Уриншийн бодисын үйлчлэлийг сайжруулна
• Ажлын уусмал навчны гадаргууд бүрэн, жигд тархаж бодисын үр нөлөөг дээшлүүлдэг
• Хөөсрөлт үүсдэггүй
• Навчны кутикулын давхарга нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

- Ургамлын амьдрах хувь нэмэгдсэн
- Ургамлын үндэсний масс нэмэгддэг
- Ургацын чанар сайжирдаг

Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: +10ºC - +25ºC
Салхины хурд: 3м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 30 минут
• Ажлын уусмалыг 24 цагийн дотор ашиглана
• Трисилоксан этоксилатыг хэрэглэх үед хор цацагчийн бункер дах өмнөх бодисын үлдэгдэл дараагийн тарималд хүчтэй үйлчлэх боломжтой тул бункерийг сайтар цэвэрлэх шаардлагатай.

Зориулалт	Хэрэглэх тун л/га	Ажлын уусмал л	Хэрэглэх арга, хугацаа
Бүх төрлийн навчны бордоо, пестицид, уриншийн бодис	0.1	3000	Ажлын уусмалыг бэлтгэхдээ шүршигчийн савны 80%-д усаа дүүргэж гадаргуугийн идэвхжүүлэгчээ нэмж хийн сайтар хутгана. Бэлэн болсон ажлын уусмал дээрээ пестицид болон бордоогоо нэмнэ. **1 литр** гадаргуугийн идэвхжүүлэгчийн ажлын уусмал 3000л байх ба пестицидийн ажлын уусмал 200л/га байх үед 15га-н зарцуулалт байна. **1 литр** гадаргуугийн идэвхжүүлэгчийн ажлын уусмал 3000л байх ба пестицидийн ажлын уусмал 300л/га байх үед 10га-д тус тус зарцуулна

Хүлээх хугацаа: 25 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+30ºC)-т 3 жил


Гадаргуугийн идэвхжүүлэгч

Үйлчлэх бодис: Этоксилат изодецилийн спирт 900г/л
Аюулын зэрэг: 3 Дунд

Зориулалт:
Идэвхжүүлэгч нь гербицидийн ажлын уусмалыг навчнаас гулгах процессыг удаашруулж, навчинд сайн тогтож түүний гадаргуун дээр тархах бөгөөд дусал болгоны талбай хэд дахин томорно. Энэ нь гербицидийн уусмалаар навчны гадаргууг бүрэх нийт талбайг нэмэгдүүлнэ. Навчны гадаргуу үсэрхэг эсвэл лавын өнгөрөөр бүрхэгддэг навчтай хог ургамлын төрлүүдийг / гагадай, морин шарилж, мэхээр, сүүт өвс/, шигүү навчтай хог ургамлын төрлүүдийн / азаргана, тайжийн жинс, ганд бадраа/ гербицидтэй хэрэглэснээр тэдгээрийн устгах үр дүн өндөр байна. Гербицидийн ажлын уусмалд бодисыг нэмэхэд гербицидийн уусмал нь бороонд тэсвэртэй болдог.

Хэрэглэх заавар:
Гербицидийн ажлын уусмалыг бэлтгэхэд адьюг цэнэг сав руу хамгийн сүүлд хийх шаардлагатай, учир нь гербицидийг нэмэхэд хөөс бий болж савнаас асгарах магадлалтай байдаг.

Бэлдмэлийн тун (л/га)	Ажлын уусмал га
0.2	200





Худалдааны нэршил : Адью

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (-10ºC) – (+30ºC)-т 3 жил

Болц түргэсгэгч, хатаагч- Уринш

Үйлчлэх бодис: Дикват 200г/л
Аюулын зэрэг: 2 Дунд



Таримлын болцыг богино хугацаанд түргэсгэх хүрэлцэх үйлчлэл бүхий хатаагч бодис.
• Таримлын иш, навчийг аажмаар хатааж, навчаас булцуу руу шим тэжээл зөөвөрлөгдөн, булцуут ургамлын хальс бэхжин хураалтад бэлдэж өгдөг
• Десикаци хийх нь фитосанитар шинж чанартай тул ургац хураалтын үед болон хураалтын дараа хөрсөнд хадгалагддаг, мөн хог ургамлын үлдэгдэлд өвөлждөг өвчин үүсгэгчийн тоог бууруулж, тархалтыг хязгаарладаг чухал ач холбогдолтой.
• Хог ургамлын иш навчийг хатааж хураалтыг хөнгөвчилнө.
• 20-30 минутын дотор үйлчлэл нь явагдаж үр нөлөө нь 1 өдрийн дараа ажиглагдана.
• Идэвхтэй бодис нь ургамалд үйлчлэн хурдан задардаг тул хүнсний аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн.

Хэрэглэх заавар:
Агаарын хэм: (+10ºC) + (25ºC)
Салхины хурд: 4 м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 2 цагын зайтай байх

Таримал	Хэрэглэх норм (л/га)	Ажлын уусмал (л/га)	Хэрэглэх хугацаа
Төмс	2.5-3.5	200-450	Хураалтаас 7-10 хоногийн өмнө
Сонгино			
Вандуй, шош, шар буурцаг	2.0-3.0	250-400	Үрийн чийг 45%-иас ихгүй үед
Уринш	3.5-4.0	200-400	Хог ургамлын идэвхтэй ургалтын үед

Худалдааны нэршил : Реглон

Хүлээх хугацаа: 7 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (0ºC) – (+30ºC)-т 2 жил

Өсөлт зохицуулагч / амин хүчлийн бордоо

Amino acid+ Epi brassinolide + Active Peptide Enzyme+Zn,Na

Ургамалд үзүүлэх нөлөө, ач холбогдол:

• Абиотик нөлөө буюу ган, хэт халалт, хуурайшилт, цочир хүйтрэлт, хяруу, мөндөр гэх мэт орчны таагүй нөхцөлөөс таримал ургамалд үзүүлж буй стрессээс урьдчилан сэргийлэх, стресс тайлах ач холбогдолтой. Ургамалд ус хадгалах, амьдрах чадварыг нь нэмэгдүүлж хамгаалах үүрэгтэй. Үндэс орчмын хөрсний чийгийг хадгалж барьдаг.

• Биотик нөлөө буюу Шавжны гэмтэл, өвчин үүсгэгчийг эсэргүүцэх, нөхөн төлжүүлэх ач холбогдолтой. Ургамлын өсөлтийг тэтгэж, шим тэжээлийг нэмэгдүүлэх олон төрлийн амин хүчил болон бичил элемент агуулсан учир ургамлын фотосинтезийн процессыг идэвхжүүлж, уургийн нийлэгжилтийг нэмэгдүүлж, үндсийг идэвхжүүлнэ.

• Навчны бордоотой хамт хэрэглэхэд, ургамлын стрессийн тэсвэр, шим бодисын шингээлт, зөөвөрлөлтийг дэмждэг бордоог ургамалд ашиглагдах хэлбэрт оруулдаг, эсийн түвшинд биологийн идэвхт үзүүлэх ач холбогдолтой.

• Ургамлын цэцэглэлтийг дэмжиж, үр жимсний хэмжээ болон чанарыг 20-25% нэмэгдүүлдэг.

• Нэгж га талбайгаас авах ургац нэмэгдүүлдэг.



Ургалтын үеийн бордоог хэрэглэх шалтгаан:

• Цаг агаарын таагүй үзэгдлүүд, тогтворгүй байдал нь (гангын давтамж,гэнэтийн аадар,мөндөр, цочир хүйтрэлт, хэт халалт) таримал ургамлыг стресст оруулдаг. Энэ нь таримлын ургалтын үе шатыг богиносгох, 1000 үрийн жинг багасгах, ургацыг бууруулах нэг шалтгаан болдог. Тиймээс таримлын гадаад орчны нөлөөнд өртөх эрсдэлийг бууруулах, ургацаа хамгаалах нэг шийдэлд био гаралтай өсөлт зохицуулагчийг хэрэглэх явдал юм.

Зориулалт	Хэрэглэх тун / га норм	1 га-д хэрэглэх усны хэмжээ	Хэрэглэх хугацаа	Хэрэглэх арга
Бүх төрлийн таримал ургамал	0.4-0.5 л/га	200л-400л/га	Ургалтын бүх үе шатанд	Доройтсон ургамлыг сэргээх, бордооны үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дангаар болон бордоотой хамт хэрэглэнэ.

Худалдааны нэршил : Амино BR

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил

Бордоо

BR24

Зориулалт:

BR24 нь рапсын цэцгийн тосонд ихээр агуулагддаг ургамлын гормон юм. Ургамалд эсийн түвшинд үйлчилж өсөлт зохицуулж, идэвхжүүлснээр таримлын эрүүл эрчимт ургалтын эхлэл болдог. Үйлчлэх бодис Эпи-брассинолидийн онцгой шинж нь ургамлын дархлаа дэмжиж өвчин болон орчны тааламжгүй нөхцөлийг эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлдэг

- Ургамалд эпи-брассинолид нь эсийн түвшинд үйлчилснээр хэт халалт, ган, хүйтрэлт зэрэг орчны стрессийг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ
- Ургалтын үед навчаар үйлчилдэг бордоотой хамт хэрэглэхэд бордооны үйлчлэлийг давхар нэмэгдүүлдэг
- Пестицидийн стресс тайлдаг
- Үндэсний хөгжлийг дэмжин хүчирхэг үндэсний системийг бий болгодог.
- Тооноложин цэцэгтний овгийн тарималд маш сайн нөлөө үзүүлдэг.



Хэрэглэх заавар:

Агаарын хэм: (+10ºC) – (+25ºC)
Салхины хурд: 3м/с-ээс илүүгүй байх
Хур тунадас: 3 цагийн зайтай байх

Таримал	Хэрэглэх тун л/га	Ажлын уусмал л/га
Улаанбуудай, арвай, овьёос, рапс, эрдэнэшиш, вандуй, байцаа, шар манжин, хүрэн манжин, төмс, лууван, сонгино, сармис	0.2-0.3	200

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил

Худалдааны нэршил : BR24

Бордоо

N+P2O5+K2O>60% (15:3:5) + PAS ашигтай бичил организм+ микро элемент + байгалийн гаралтай өсөлт зохицуулагч

Зориулалт: Ургалтын үеийн навчаар үйлчлэх

Бүх төрлийн таримал ургамлыг (үр тариа, улаан буудай, рапс, эрдэнэшиш, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимгэнэ) бордоход тохиромжтой.

Cocoly бордоог бүх төрлийн усалгаагаар болон дараах аргаар хэрэглэж болдог. Үүнд:

- Навчинд шүрших
- Дуслын усалгааны системээр
- Гадаргуугийн усалгаагаар
- Тарилттай хамт
- Тарилтын өмнө хөрсөнд цацах гэх мэтээр хэрэглэхийг зөвлөдөг.
- Мөн ургамлын бордооны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бусад бордоотой хамт хольж хэрэглэж болно.



Хэрэглэх заавар:

- Таримлын ургалтын идэвхтэй үед 7-12 хоногийн давтамжтай хэрэглэнэ.
- Зөвлөсөн тун нормын дагуу бордоог хэрэглэнэ. Харин тухайн бүс нутгийн нөхцөлөөс хамааран хэрэглэх тун өөр өөр байж болно.

Хэрэглэх арга/зориулалт	Хэрэглэх тун кг/га	Ажлын уусмал л/га
Хөрсөнд (дангаар)	100кг-200кг	-
Бусад нийлмэл бордоотой хамт тарилтын өмнө болон үрлэгээний үед	0,2-0,4	-
Бүх төрлийн тарималд навчаар шим тэжээл өгөх зорилгоор`	0,2-0,4	200
Дуслын усалгаа болон бүх төрлийн гадаргуугийн усалгаагаар	0,2-0,4	1000
Үрслэг бойжуулахад	1 ширхэг мөхлөг	500мл - 800мл

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүчиллэг болон шүлтлэг химийн бодис эсвэл бусад төрлийн бордоотой хамт хэрэглэхэд аюулгүй бөгөөд цацах үед хурц нартай, агаарын температур хэт өндөр эсвэл бороотой үед хэрэглэхээс зайлсхийж, хуурай нөхцөлд хадгална. Хүүхдээс хол байлгах шаардлагатай.

Худалдааны нэршил : Коколи

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил

Бордоо

N+P2O5+K2O>60% (13:7:40)

Зориулалт: Ургалтын үеийн навчаар үйлчлэх

К хүч нь калийн өндөр агууламжтай тул усанд бүрэн уусдаг, таримлын ургалтын үед навчаар үйлчилдэг өндөр үр ашигтай, ургацыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг нийлмэл бордоо юм.

• Хүрээлэн буй орчинд ээлтэй
•Ургамал хамгаалах бодис болон бусад төрлийн бордоотой нийлэмжтэй
• Гербицидээс үүсэх стрессийг бууруулна
• Таримлын чийгийн нийт алдагдаг бууруулна
• Үрийн цутгалт болон жин, массыг нэмэгдүүлнэ
• Үр боловсрох хугацааг түргэсгэнэ
• Бүх төрлийн таримлын үрийн ургац дээшлүүлэхээс гадна ургацын чанарыг нэмэгдүүлнэ

Таримал ургамал калийн дутагдалд орсноор ургамлын газрын дээд эрхтэн, үндэсний өсөлт,хүйтэн болон налалтад тэсвэрлэх чадвар буурч үрийн ургац буурна.



Хэрэглэх заавар:

Таримлын ургалтын хугацаанд нийт 3 удаа хэрэглэж болно.

N хүч + K хүч + BR24 ; K хүч + BR24 ; K хүч

Таримал	Га/норм кг/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх хугацаа
Төмс, байцаа, лууван, сонгино, сармис, шар манжин, хүрэн манжин	0.2-0.3	200	Шим тэжээлийн дутагдалын шинж тэмдэг илэрсэн үед, ургалтын дунд үе шатанд (үр, жимс, булцууны хөгжил болон ургацын чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор)

Худалдааны нэршил : К хүч бордоо

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил

Бордоо

N+P2O5+K2O>60% (20:20:20) TE

Зориулалт: Ургалтын үеийн навчаар үйлчлэх

Бүх төрлийн тарималд ургалтын үед навчаар үйлчлэн цогц тэжээл өгч таримлын чанар болон ургацыг нэмэгдүүлдэг. Азот, фосфор, калийн өндөр агууламжтай, усанд бүрэн уусдаг нийлмэл бордоо нь ургалтын эхэн үеэс л таримлыг шим тэжээллээр хангах, ногоон. массыг нэмэгдүүлэх, үндэсний хөгжлийг дэмжих, ургалтын эрчим нэмэгдүүлэх үр нөлөөтэй.

• Таримлын хүйтэнд болон ганд, өвчин хортонд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
• Гербицидээс үүсэх стрессийг бууруулна.
• Таримлын чийгийн нийт алдагдал бууруулна.
• Үрийн цутгалт болон жин, массыг нэмэгдүүлнэ.



Хэрэглэх заавар:

Таримлын ургалтын эхэн үеэс дунд үе хүртэл таримал бүрийн онцлогоос хамаарч 2-4 удаа навчаар бордоно.
NPK 20:20:20 > 60% + TE
N хүч

Таримал	N хүч кг/га	K хүч кг/га	BR24 л/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх хугацаа
Бүх төрлийн хүнсний ногоо	0.2-0.3	0.2-0.3	0.1-0.2	200	Бутлалт жигдрэх үеэс навчаар, Жинхэнэ 3-4 навчтай үеэс иш үүсэх хүртэл, Ургалтын бүх үе шатанд

Худалдааны нэршил : N хүч бордоо

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил

Бордоо

Борын бордоо

Зориулалт: Ургалтын үеийн

Бүх төрлийн тарималд ургалтын үед навчаар шүршиж хэрэглэхэд шим тэжээлээр хангаж, таримлын чанар болон ургацыг нэмэгдүүлдэг, цэцэглэлтийг дэмждэг чухал элемэнт юм.

• Бор нь ургамлын нүүрс ус, уураг болон нуклейн солилцоонд оролцож, эсийн хуваагдал, аминхүчил үйлдвэрлэлд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

• Бор нь фосфорын хэрэглээг нэмэгдүүлж өсөлтийн цэг рүү шилжих хөдөлгөөнийг хурдасгаж болц түргэсгэдэг.

• Таримлын хүйтэнд болон ганд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

• Цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэх нь үр жимсний гарцыг төдий чинээ нэмэгдүүлдэг.

Борын дутагдал нь ургамалд:

• Ургамлын оройн хэсгийн өсөлт буурч, үндэсний системийн хөгжил удааширдаг.

• Үржлийн үе шатыг гажуудуулж, үржлийн эрхтний хэлбэржилт, цэцэглэлт, жимслэлтийг зогсонги байдалд оруулна.

• Үр тарианы таримлын хувьд борын хурц дутагдлын үед хажуугийн нахиануудаас түрүү үүсдэггүй.

• Тосны таримал рапсын хувьд бор дутагдах үед иш бүдүүрч, цэцэглэлт удааширч хонхорцгийн хэмжээ багасаж үрийн гарц буурдаг.



Хэрэглэх заавар:

Ургалтын эхэн үед N хүч K хүч бордоотой хамт зөвлөсөн тунгаар хэрэглэх нь бүх төрлийн таримлын үндэсний системийн хөгжлийг дэмждэг.

1. Үр тарианд ургалтын эхэн үед бордоход бутлалтын явцыг идэвхжүүлнэ
2. 2 дахь бордолтын үед түрүү үүсэлтийг дэмжиж, үрийн цутгалтад сайнаар нөлөөлдөг.

Таримал	Bo21% кг/га	Ажлын уусмал л/га	Хэрэглэх хугацаа
Улаанбуудай бусад үр тариана ургамал	1.5-2.0	200	Бутлалтаас түрүүлэлтийн үе шатанд
Рапс	1.5-2.0		4-6 навчтай үеэс цэцэглэлтийн үе хүртэл
Ногоон тэжээл	1.5-2.0		Ургалтын эхэн үед

Худалдааны нэршил : Bo21%

Хүлээх хугацаа: 40 хоног
Хадгалах нөхцөл, хугацаа: (+5°C) +30°C)-т 3 жил



AminoBR

- Цочрол хүйтрэл
- Соёололтыг идэвхижүүлэх
- Ургамлын өсөлтийг дэмжигч
- Гэмтлийг нөхөн төлжүүлэгч
- Ган, хэт халалт хуурайшилтын эсрэг

ТАРИМАЛ УРГАМАЛ



Ургах Бухнийг URGA.MN-с

САЛБАР-1
БЗД, 3-Р ХОРОО, АРСЛАНТАЙ ГҮҮР,
ХХААЯамны ХОЙНО, 20/2-Р БАЙР
7272-0808

САЛБАР-2 / ТӨВ
БЗД, 1-Р ХОРОО, ЗАЛУУЧУУДЫН ӨРГӨН
ЧӨЛӨӨ-21, САНСАРЫН И-МАРТЫН
ЗАМЫН ХОЙНО НОРТ ЦЕНТР 109 ТООТ
7272-0808
6690-9090

САЛБАР-3 / УХБодисын агуулах
СХД, 32-Р ХОРОО 384 ГАРАМ,
29 ГУДАМЖ 62А ТООТ
9997-9628
6690-9090

Ургамал хамгааллын зөвлөх мэргэжилтнүүд:
6012-1212
6014-1414
8894-0052

Таримал Ургамал ХХК

tarimalurgamal2016@gmail.com
tarimalurgamal2016@urga.mn